



Chausseestr. 19  
14621 Schönwalde

# Tierärztliche Praxis Pausin

Praxis für Pferde und Kleintiere

[www.tierarzt-pausin.de](http://www.tierarzt-pausin.de)



Kleintierpraxis  
**Dr. Petra Schäd**  
Tel: (033231) 60199

## Informationsblatt zur Narkose bei Hunden und Katzen

Unter Narkose versteht man die Schmerzausschaltung am ganzen Körper die mit Muskeler schlaffung und tiefem Schlaf einhergeht. Hierzu werden bestimmte Medikamente (Narkotika, Anästhetika) eingesetzt, die eine vorübergehende Aufhebung dieser Funktion der Nervenzellen bewirken.

Der Hauptwirkungsort von Narkotika ist das Gehirn, das zentrale Nervensystem. Gleichzeitig haben Narkotika aber auch Einfluss auf andere Körperfunktionen, wie z. B. auf die Magen-Darm-Aktivität, Atmung, Kreislauf, Herzarbeit, Temperaturregulation. Je nach Eingriff, Eingriffsdauer und erforderlicher Narkosetiefe werden die Anästhetika ausgewählt und sorgfältig auf den Patienten abgestimmt. Der Tierarzt kennt in der Regel seinen Patienten und die Risiken für jeden einzelnen. Daher gehören Narkosezwischenfälle zu den großen Ausnahmen!

### **Bitte beachten Sie folgende Punkte, um das Narkoserisiko zu verringern:**

Durch den Einfluss der Narkose auf den Magen-Darm-Trakt und den Gleichgewichtssinn kann es zum Erbrechen kommen.

Daher **vor** jeder geplanten Vollnarkose:

- 6 Stunden völliger Nahrungsentzug für den Patienten
- Trinkwasser darf bis etwa zwei Stunden vor Narkoseeinleitung angeboten werden.
- Blutuntersuchungen vor dem Eingriff können Stoffwechseleränderungen aufzeigen (bei der Voruntersuchung oder bei der Narkoseeinleitung Blutprobenentnahme möglich)

### **Nach** der Operation gilt folgendes zu beachten:

Eine Narkose führt zu einer Erniedrigung der Körpertemperatur.

- Der Patient sollte zu Hause bei Zimmertemperatur, in einem ruhigen Raum, auf einer Decke liegen.  
**!!!** Und zwar auf dem Fußboden, damit sich das Tier beim Torkeln in der Aufwachphase nicht durch Herunterfallen verletzt.
- Trinkwasser kann wieder angeboten werden, sobald das Tier völlig erwacht ist und nicht mehr schwankt.
- Futter kann etwa 9 Stunden nach der Narkose angeboten werden.
- In den ersten Stunden nach der Operation kann es erneut zu Erbrechen kommen.
- In seltenen Fällen kann es zu Blutungen an der Operationsstelle kommen.  
**! Bitte setzen Sie sich in diesem Fall umgehend mit uns in Verbindung !**

Eine Besonderheit bei Hunden:

Wenn die Narkose abflaut, können manche Tiere fürchterlich jaulen.

Dies hat nichts mit Schmerzen zu tun!

Wir nennen diese Patienten oftmals etwas flapsig »Sänger«. Dieser Zustand kommt durch eine Art Rausch in der Nachwirkung von bestimmten Narkotika zustande und ist völlig harmlos aber durchaus nervtötend.

Durch Einsatz von modernen Narkosemitteln, häufig in bestimmten Kombinationen, werden die unerwünschten Wirkungen möglichst gering gehalten.

Unter dem Begriff Narkosezwischenfall bezeichnet man während der Narkose eintretende und durch sie bedingte Komplikationen.

Daher ist das Gespräch mit Ihnen bezüglich der geplanten Narkose und die Einschätzung des Narkoserisikos von entscheidender Bedeutung.

Die Narkose wird üblicherweise so gering wie möglich und so tief wie nötig bemessen.

Dennoch beinhaltet jede Narkose/ Operation auch Risiken.

Im Aufklärungsgespräch gehen wir auf die möglichen Narkoseformen ein und beraten Sie hinsichtlich der Vor- und Nachteile, auch die Kosten werden angesprochen.

Selbstverständlich sind nicht alle Tiere gleich.

Es bestehen Unterschiede, rassebedingt und auch individueller Natur, gegenüber der Wirksamkeit von Medikamenten, somit auch gegenüber Narkosemitteln.

So kommen in der Phase nach einer Vollnarkose zeitliche Unterschiede zustande. Diese können zwischen einigen Stunden bis zu drei Tagen liegen.

Sollten Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen.

Ihr Team der

**Tierärztlichen Praxis Pausin**